



# Iatrogénie

**Quand y penser ?** Devant tout nouveau symptôme surtout chez le polypathologique, polymédiqué

**Fréquence ?** 10 à 20% des causes d'hospitalisation  
Évitables dans 30 à 60% des cas

**Médicaments en cause ?** cardiovasculaires, antalgiques et psychotropes.  
Attention à l'automédication et aux multiples prescripteurs (ophtalmo)

**Facteurs de risque :** poly médication, petit poids, insuffisance rénale, ATCD d'effets indésirables, troubles cognitifs et visuels.

**Situation à risque :** génériques, sortie d'hospitalisation, troubles cognitifs (qui donne les traitements ?), traitements à marge thérapeutique étroite, affections intercurrentes (canicule et diurétiques ; AVK et ATB).

**Prévention :**

- Evaluer le rapport bénéfice /risque et hiérarchiser les priorités thérapeutiques
- éducation+++du patient et/ou entourage

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_675707/ensemble-ameliorons-la-prescription-medicamenteuse-chez-le-sujet-age-pmsa](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_675707/ensemble-ameliorons-la-prescription-medicamenteuse-chez-le-sujet-age-pmsa)